難 峯 普

濟

方

满悶便出或出數針至于一石者是也 出還流入胃中或如豆羹汁或如切嫩血疑停胃中因即 問吐之時血從吐後出或一 内砌者出血如阜如但不從阜孔出是近從心肺間津液 絕之後胃中冷物不能消化便煩悶強嘔吐之所食之 金要論日禀上云吐血有三種有內如有肺疸有傷 於勞倦飲食過常所為也肺疸者或飲酒之 血 一衝城因傷裂胃口吐血色鲜赤腸絞痛自汗 ア
方
十

**些血四肢清瘦目眩時時前後失血病名為何何以治之** 故始則恭去後隨病而上下脉緩小可治細數加急者漸羸瘦此由悲憂傷肺肺主氣而血隨氣傷則血無所 而肝傷女子則月事夷少不來也 治先因吐血止而後嗽中血出如線引肠 出鄉包子將整日西書首重半斤者以 炙至 出用 令半綿新 研供 枝用 爛城 各童 柳弄熬 約得取此差宣子 大便

酒下三十元食前臨卧服更有使胡黄連 右件等分為細主 烏梅內 當歸捌兩金牙石 青楠皮 當歸 白豆花仁酱伍 人參 杏仁 元治些釈及一 人多 マケナ **基問子**兩 木香 切積聚敗些為病 各壹 羗活 水銀肆兩水煮豆伏時 怕山 柴胡 知母 安息香 附子 没藥 茯苓

笛同用麵糊為元如梧桐子大治乾血氣積血氣有巴右為細末分一半別入燈上燎者巴豆杏仁各二十一 氣差悶不下食兽軍大效一半藥末只煉蜜為劑廻面 向東杵一 小用之 立杏仁者名大藥無巴豆杏仁者名小藥治產後及血 黄葉形堂龍骨歷 乾曹 湯使臨時 治下血連月不差 千下喫時旋元小豆大每服五七元看病七 黄連 茯苓 大膽俗肆不如皂角壹挺 赤岩崩 泰皮 白頭绡 甘草酪冬

右研為細末每服 血出用童子小便調服三服必効 分和滓温服不以時 柳砂 水蛭恰肆當歸 秘格宣海馬雪乾漆香 日星血出 、
方十 血竭 八血氣産 龜咯血出 一銭冷水調一 鵬砂 没藥 好冬花 知母 切血形乱語眼如血袋 下如產後血上阿魏各量  $\equiv$ 重重債者龍脳壹錢 木香

葉同煎咽痛入乾薑皂大田乏入松二寸薑七片東二 右為細末水一盡煎三銭食後臨即執服盗汗入竹三 火龍肝清難 幣甲信 **置嗽甚入杏仁七箇觽悸入茯神半錢煩渴入鳥梅 窗破碎氣逆入橋皮二錢頭見痛入生甘草二寸咯血** 紅花少許同煎 食思風目視眩眩足脛腫痛 主傷中肺無不足脇下疼痛上氣咳嗽睡有膿血 阿膠路重食菜更 柔白皮 紫苑路 奉麻仁堂两 桂两半 · 格壹芳朝肆两

右為細末每服二錢水三分酒七分煎至七分去空 服不以時 六分去滓温服 伏龍肝紅行如 細辛鄉 鳥魚骨 白木 ナナ 吐血下血衂血崩血漏血 白土 生地黄西方藥 盏生費三片館 桂齊叁 Ľ7 黄耆 生乾地黄酪貳 龍骨 芳元

右為細末每服二錢空心米飲調下 表寫治咳嗽睡血火不較 在為細末每服/錢水一盏煎至七分食後去滓温服 右為細末每服二錢七用新汲水八分化破柘葉膏少 易治婦人汗血如血尿血下血 黄連每放用蜜炙焦煙 沉香 白芍藥 竹遊旗 乾地黄雕 荆木穗兹黄 當歸 甘草 考 黄老日輕沒各意兩 桑寄生 麦門冬科 提實轉壹歲色 桂香壹 當歸

4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Į						
ı						
ŀ						
ŀ						
Ì						
ŀ						
- 1						
1						
İ						
ļ						
;						
					•	
	•					
	•					
135						
原						
原缺						
щ <b>Д</b>					<del> </del>	

阿茄吃元才在後 右為建末每服二錢水一盛煎至七分食後去滓温服 桂路塩 右件等分為細末每服三錢水一盏煎至七分去滓温 氣弱或投高墜下勞傷所至其脏虚弱當 服不以時 山藥 甘草 砂治吐血衂血下血 生竹皮情考藥 黄本縣高當歸經治吐血如血湯血皆藏氣虚勝惡 阿桔膠梗 黄岩

後温服 右為細末煉塞和元如彈子大食後茶清嚼下一元相葉 赤芍藥 计草语生 右件等分為應末每服三錢水一盏煎至七分去浮食 阿膠 熟地黄 刺劑 额 总 治 吐 血 栢茶 治鼻朔晝夜不止 生地黄 黄連 附子 栢子仁 大黄 白七 生地黄

去滓温服 右為魔末每服五錢水二盏竹茹一雞子大煎至一 右為應末每服五錢水二盏入青竹茹半雞子大同煎 時前後失血此由素經大失血者醉入房中氣竭傷 日治吐血光間 腥臊臭出清液胃肠支病妨於食目 犀角屑 一盏去滓温服 治五臟經熱算砌心胃煩悶 李等 當歸 刺動於宣生地黄於 黄耆 黄蓍 一盏

虚寒脉凝欲絕者宜加乾薑附子桂等分右為應末每服二錢水一盞煎至六分去 心米飲下 為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元空 當歸 芳府煎 綿灰 治咯血 治宫殿虚弱下血不止 阿膠科 考藥 五靈脂 草谷半 乳香錢賣防已發 五倍子船壹 一多新至六分去浑温服裏急

右為細末每服二錢水一盏前至六分去浑食後温服 右為細末前黃耆湯調下二錢及播向鼻内先合水 口閉目播入然後吐出水即止神妙 石為細末煉盛和元如雞頭大每服一元合化際建 設治大便出血及口鼻皆出血血上骨心氣急此是 黄湯治鼻奶面無類色 柜菜壹雨 生乾地黄 生地黄酮 赤芍藥赤茯苓谷老 <del>芍藥</del> 阿膠 生竹茹高冬 當歸路半 地骨皮西

右坐令与以水一大盛半煎至一盛去海入生地黄汁左坐令与以水一大盛半煎至一盛去海入生地黄汁速核定此方的四味死分丽其衛生秘方內有黄芝白連頻類 致賣台 右先下乳煎即下鹿角腰銷即 均器中疑以竹刀割服之執水· 豊汁酪煮 阿膠 鹿角膠讀 重治血少無多幹執着無瘦 一治鼻姆不止此是陽毒傷肺 乳汁清 伏龍肝 黄芩 下半匙食後臨卧 野等緩大前工 地骨皮

世血下血 右為細末每服一 右為應末每服二錢水酒少許煎至六分去滓温服 部腫涌中思莲杵騎下堅疼心腹脹滿氣急奔衝下黑 悸恍惚昏昏似醉層外班駁失心顛狂面腫心悶尸注於吃元治人新 百疾諸病失血寒熱往來不知痛處或 紀治勝風下血 影主脾氣不足下焦虚冷骨膈滿塞汗出脇下支流 夢想顛倒身外瘦損不起下即咽中噎塞疳匿下利 槐花醴 黄耆 一錢水一盏煎數沸不以時候服 方藥 甘草雨壹

不以時 有為細末水麦麵糊和元如梧子大每服一元米飲工 石先將草藥四味同搗爛漸漸入石灰再搗勻捏作 麦門冬於甘草 陰乾為末乾麥之 石灰禮 蘆根科 治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止心中壅思 地骨皮 馬遊頑 地黄喜兩 川井麻 茅根 **並** 川大黄隆 百草霜痘 胡椒香畫

胃中冷不能就消便覺煩悶嘔吐所食之物與氣共上虧 因傷胃烈 石為鹿末每服二錢水一盏煎至六分去滓温服 石為細末煉蜜和元如梧桐子大安服米飲下十元食 一般完治吐血腹中絞痛汗出肾中問此由飲食過傷 **向細末每服四錢水** 治人員界姆不止 治吐血不止 オナ 一盏煎至六分去滓非時温服 阿膠等分

右件等分為細末每服二錢米飲調下右件等分為細末每服二錢米飲調下 右三味為細末內魚腹中以數重濕紙费入糖灰火內 飲下腸風下血並治焼熟取去皮骨後焙乾細研為末每服一大錢空心未 立參 港黄 营州 木香於意

化亦佳忌熱類多牌等物 合分三服此藥治熱毒蠱妙石四味以咀以水五升煮取一升 温服供熱者以犀 右為細末煉蜜和元如酸棗大每服一元温水化下含 麦阿冬旗 參 治鼻血 治雜血無治點及苦 ケナ 犀角 地榆谷湖客東合 土 **遂等下血而有熱** 

由逆氣停留血在骨上其脉沉伏急須吐之 米飲下 在為細末水黃麵糊元如梧桐子大母服三十元空心 無所居不循經絡而行故其出亦暴譬如泥水之來 治血 血服湯轉加悶乱煩躁紛紛欲嘔顛倒不安者 分為應末每服五錢水二 吐血至一 乾薑 全喜渴心中煩宜地黄煎姑後 到脉細小氣奔急此由陽暴逆其如 當歸 阿膠 盏煎至一盏去滓 腽

右件等分為細末米 石為細末温漿水調方寸也須更更吐清黄汁或血 一升無害 黄耆 完貼在蒜上却以紙表定立地撞頭三次立止洗两脚心净次用蒜二片研如泥貼在脚心上為細末醋煮麵糊和元如麻 粒大遇邮時先用 元治事物不止 治吐血不止 7.5 鵬砂 阿膠 參酌賣 錢不以時

出而色鲜心煩躁問時欲引出至一二到此陽邪暴入於 地熱則經水沸溢而湧起故有如血肺痘其證大同而小 盈則陰虧經所謂陽勝則陰病陰勝則陽病諸血衂血由 宣無侵除陰氣被傷血失常道或從口出或從阜出若暴 如得執則流散盖人之經血譬如天地之經水天暑 金湯货在 了服五錢水二盞煎至一 梔子香豆 甘草半兩 一到悶絕者宜

時 右將地黄汁熬去一半內大黄末一 桐子大每服五元米飲下不以時 放死治吐血咯血吸血 右細剉每服二錢水一大<u>盛煎至六分去滓温服</u>食後 右等分為細末煉蜜和元如櫻桃子大舍化一元不以 炎參設治一切血 真紫苑 茜根 **虚監根**體 治虚冷下血不止 人參半两 十三 一人與再熬和元如石

**麦熟稍熟任意食之** 右以青竹筒一箇入水一升下米與噶密封了口重湯 在為細末每服十分水一盏煎至七分去滓不以時服 在寺分為細末水煮麵糊和元如梧子大每服三十元 大刺剪贖 相思于半两 石灰炒赤 治男子婦人小兒鼻血

右為細末每服一錢新汲水調下 右為細末或應末或不搗同煎温服不以時 右為細末社 有為細末每服半銭水煎乗熟服不以時川芎醯 甘草塘 裏治算血 浦黄 竹菜等分 龍骨等分 ト り

治金瘡等型方 煉旋添白沙蜜三兩俟如稠錫用新垍瓶収之少許含化 石臼中播旋洒紫腐水只取一兩盏許俟据得爛新綿右用新柏葉注墓上採寺中最佳三片清水淘控乾木米飲下日二三服 裂取自然计生銷重憑退銀盂內重湯慢火 右為細末酒養麵糊為元如梧桐子大母服五元空心 來肆两酒浸賣乾淡炒煙出碎一治血般臍腹堅脹下痢羸瘦

右研過入麝香少許温酒調下石生取為末每服二錢米飲調下不以時 右為細末以唾津調塗 石濃煮服之立定 剪金花并遊葉陰乾 血下血後遇不止及産後渴不止 蓮子心不以多少 **餓州白垍器** 治吐血 í 1、等分 當歸同原五七沸通口類三服立効 石爲細末食前空心 當歸好物 一服半 · 最子男左女右繁中拍根於風府完以手 一大錢濃煎赤小豆汁取一盡與 十王

罷用新水輕着洗四面并面上不得動着至三两時辰候盡再捻一面出一面吸磨得少上了~~~ 用倒流水於硯瓦中以墨同研約半盡好盡香為度損 右為細末用 察說治鼻血 燒灰於出血事中真明净乳香一塊皂子石為細末用一錢雞子清或温水調下食後 急以樑塵歌磨捻於出型鼻竅前氣吸一吸 |治食吐用胡椒新汲水下十粒無時立効 黄蜀葵結藝 治吐血咯血 ガナ ナナ 一開拍

右不以多少搗為細末每服秤半兩用水兩大盡生離天南星 揀不軽疑維拍 不安隨咯睡有清血 嚼下不以時當大指大十塊同煮水用盡温湯洗净蘿蔔用温熱質 正白汁放在青竹片上不可對面恐汁射人損目即便放之 10出血不止用蟾酥涂立止取蟾酥之

兩炒去獲為末同和元如梧桐子大每服十元十五元 右用河水每遇洗衣罷便冷肠時下血如泥水人不差者 石用水二升煮去洋熬成胃别入神麹 个湯下不以時 墹皮 焼灰存性 一錢温酒送 オナ 七七 兩炒枳殼

右等分細對每服三錢水一盡煎至八分去浑温服極 川芎路東甘草 桂兩壹 阿駅當歸 白芍藥路塞 人參 為鹿末每服二錢水一盖生薑三片棗 倉木米出 皮鱼 甘草 服子 極大炙令黄焦末以難子白和 一錢米飲調下次服 桂香 燈心 阿膠痘 校同前室

方為細末每服二錢白湯調下食 紫金粉聯分露蜂窠 紫金粉聯分露蜂窠 大香女 分温服姆血以酒半盏化一元服之右為細末煉蜜和元如拍頭大一元以水七分煎至五 石以羊糞乾者 一枚扎在血出量中 人食後臨即 貝母肆分

於記治人挾風冷入脬中小便肥濁如膏或如獨 為細末每服二錢水一大盡生薑一分煎至七分 桑白皮 人參 黄芩浴 桑白皮 治氣淋 湯浸刷 小便 茯苓 **蕈麦**麦 滑石齊意沉香

謂之血淋宜此阿膠湯其不痛不溢者非熟非淋由發蓋心主血遇熱即流散滲於將中許其心脉大散而斟盡心主血遇熱即流散滲於將中許其心脉大散而斟若細研酒一盏調服移時服七寶散 五各等分研与温酒調下一次 現班 沒藥 乳香 沒藥 乳香 相搏結而成石訪其脉散溢而無常度謂之石冰 自 与温酒調下一錢腹空服仍先用引強郁李仁點沒去皮研入麵少許研与令沒藥 乳香 滿黃 百部末

乗心心氣散溢血無記 與小腸受熱腸中熱則傳道遊或由服五石及其氣搏之若便無微痛漸二艱難數往而欲出漏不可忍亦由右各等分為細末每服二錢酒調下 石為鹿末每服五錢水二<u>盏煎至一盏去滓温服不以</u>車前子頌 猪苓 赤芍藥 蒸子 治小便疑遊不通 茯苓 車前子 澤鴻 茯苓 滑石 白术 阿膠合肆 木通

智湯下四十元 石為鹿末母服五錢水二盏煎至一盏去滓温服食後 益智人 為細末酒麦麵糊和元如梧桐子大每服空心煎益川鳥頭 暗雨性媽粉豆雨炒 石菖蒲 壹两 白龍骨燈 赤茯苓酸菜子 阿膠畔 野畔 乾薑縣 麻子 遠志略堂 野豚細而弱服此湯立城 遠馬取冷脚氣於 カナ 石韋 澤瀉 + 自木

度腎與膀胱俱虚了 及野與膀胱俱虚不能禁固至於脛酸無力其脉微弱及夢恍惚訴其脉微散宜大建中湯為明發又或作勞過人數既以即思慮過多心氣散溢小腸又弱不能禁制者至 **百彩元若小便滑數日夜十數行此由脟門不閉水液多利日夜數十行至不計數者頻服** 而雞肚蓝两一方加磁石半和元梧桐子大米飲下三十元空 服三錢水二盏煎至一盏服之說去小便

此由陽氣不固陰無所守五液注下訪其脉散遊欲絕而 身冷者死治属虚損 小上訪其脉右手遊左手急大宜服 宣影若平暴不通小腸膨急氣上衝心悶欲絕死此由 右為細末酒麦麵糊為元如梧桐子大米飲下三 有為細末每服二錢水一盏至七分去海温服不以時青橘皮酸 葵子隨 苍白鹭 · 飛来併膀胱或從鶴。憂氣無所伸對而不流氣衝將於 記者小便純血血下凝結假假氣短日就羸瘦不食 鹿茸馬壹 完然子 東潭湖魚末 再焙 乾地黄

治小便暴不通方 一方十 苗香 生茶等分 三

一赤黄漸漸不通唇腹膨亨此心經蘊熱傳於小腸小腸 濕冷於胖胖屈拇而系轉其心脉大而牢治之 容認論日小腸為受威之府傳導水沒若始覺小便其右為細末空心米飲調下二錢日進二三服 至七分和海空心温服右為細末每服二錢水一大盏益二錢蕊白二寸同煎 右同研為細末沸湯點二錢温服 厚朴 果茶弱菜植 治白便獨夫婦小兒並用專治白濁不治淋 治小便淋涎疾痛 牡礪 白木商主 滑石

右為細末每服二錢自湯點食後臨即服之右為細末每服二錢自湯點食後臨即服之 右為細末每服二錢自湯點食後臨即服之 右為處末每服五錢水二盏煎至一落去海温服 爲度末知再服 石韋 カナ 車前子等分

石以皂角燒灰為細末每服二三錢粥 如灰汁 右以鐺炒用布綿帛表影腦下投之小便當漸通之用 在臨卧每用一合湯浸良久澄去浑乗温頭服之其公 蓝二升 便不通或利不得股滑樂急問欲絕方 純糯米稈一把去穗去根取稈净器中焼作灰 一味空心濃前營草根汁調下二錢乃通 オナ

ヌ方 后記治小便數日夜一計 右細末酒調二錢食前蕊白酒尤佳 右取純糯米糠一手大臨即時炙令軟熟陷之仍以温 赤小豆焼熟 治腫滿小便不利 心曆中大作文炷炙令款為度

翌日乃安此開格之病極為難治兆所見者此 趙令儀妻忽吐逆大小便不通煩乱四肢漸冷無限 小便不通 大承氣 日三服 处树為元如梧桐子大每服五十 世四

**麦門冬** 首星浦 卷相 桂香 一補益心氣常服生 心心痛附 个用東內為元如蒙豆大以牛黄等 紫石英 前胡 乾薑 豆卷 秦光 鐵粉精 茯神 防風 當歸 麝香 白术 遠志 細辛 澤寫 分割壹

丘心疾 恍惚眩胃恐怯驚怖及治骨熱諸勞失精乱夢飛口 百部 治憂愁 色黄食少倦怠夜寢盗汗胃府無痞以至大怒 吐血失血丈夫勞損婦人血虚產前產後虚損 思慮過傷心氣又 遠志 菖蒲 具母 赤石脂心 桂两計 两半

右為細末每服二錢 如大段血無虚弱食少不眠煎酸棗人湯下 防風 補心虚驚悸 補心虚疏悸治虚風顫掉風中有執眩冒風 阿膠 大豆卷 大每服三十元人參湯 犀角 苦 **芍藥白者 白木** 

右除研藥外為細末與研藥和勻每服半錢食後臨了大豆卷浴貳 神翹 特題 生地黄浴室 白芍藥 防風 阿膠 當歸 伏神 餘邪尚留經絡小勞颠劇又不可服諸補藥者宜服氣或壅邪漸退氣血猶弱或胃口虚煩飢而不欲飲寒薄於阳事寒熱相壅攻衝肺經或咳嗽曲折或皆寒治黑氣怯弱將温過度積温成熱蓋蒸五臟或外

至六分去淳 貝母 **甘草**香意、 天門冬 鵬砂 桑白皮 鎮心安神解執及肺指 ガナー 中温服不以時本服二錢水一文 琥珀 真珠 生犀 山難朝 盛入生薑五片聚一个同前 粉馬壹 Ξ 安息香 玳瑁 麝香 遠生腦

更以金箔表之每服一皂子大食後含化九嫩血與阿膠 相雜服之妙 都為細末合研包 人參 紫石英 白石英 龍齒 治風氣驚弱恍惚失常忽嗔恚悲愁志意不樂 治健忘安蒐號 白木 遠志 遠志 地骨皮 防風 一錢温酒調下 天門冬 朱砂 附子 乾薑 細辛 生地黄

人多 桂路堡 五味子 車前子路上人多 桂路堡 五味子 車前子路上 下漸加三元以利為度是生态猪內野猪肉蘆笋生十三味為細末煉蜜和元如梧桐子大每服一元米甘草燈 巴豆慎指赤足蜈蚣債 是治九種心痛及悪血結塊 多多 朱砂肆分 具窗在个

石為細末煉蜜和元如梧桐子大空心米飲下七元 完安定心神亦治虚損方 著 當 歸 遠志 桂蜀 阿廖務賣 乾薑肆两乾地黄晒桂縣 澤馮 當歸 朱砂陸所 菖浦路室

桐子大每服二十元不以時食治湯下右為細末入研了藥今与煉蜜和揚三五百杵元如梧 石為細末每服三錢煎石榴根 乾雷漆元 治蛔虫咬心痛悶絕坐卧不安 治心痛 、方十 鶴 石脂為至龍磨 萆薢 麝香浴壹柘子仁 伏神路半 檳蕪椰夷 人参 五 两陸 當歸 菖蒲 兩伍

大家寺更前取三升一服五合差忌如常 大家寺更前取三升一服五合差忌如常 大学 甘草 略真生薑汁紅 蜜精 蜜精 於易療産後心痛大寒冷所致米飲下一方有黄本一两 存為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元至十五元陳皮 川椒 甘草 當歸 桔梗 醉壹 治心經執 乾薑酪半桂醴 · 盏壹中

松神思不定常服鎮心安神英議強記 是治心氣不定恍惚健忘語言錯乱或即寒遊發 下寅午 戌時服 黄橘皮 湖人麥陸分良 書台分 為書月子 五捌 分 煉蜜和元如梧桐子大每服三十二 療心痛癥塊硬築心氣欲絕 グト 桔梗 遠志 浦黄為元如彈子大新水化下 白芍藥洛捌 人參 茯苓 龍遊的壹 桃仁伍治 元則人參

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元米飲人參 赤石脂 略壹 乾地黄丽麥門冬畔 即氣逆行遂乗於心蓋肺在膈上病則不可以偃故動 行六七里進 一若心痛不得即如從心間動作亦甚急面色不變 治心中恍惚不年 菖蒲 八升養取三升五合去海分温三服記如 服不利忌猪內生冷油膩雞魚粉食 龍齒

· 一島頭路座 · 高頭路座 · 高麗ラブ 檳榔 一名捌人祭 赤石脂棚子 桂分隆 桂乾 **燕問冷熱蛔虫心痛** 檳榔成 旗士元空心 蜀椒雕 盏去滓温服 **购各** 伍

夢悉不自知及諸失血舌本強直 服加至十五二十元為度忌生态桃李猪內雀內等 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元酒下日二 尽猪肉生态油腻小豆粘食等 原即延年療冷氣又刺心痛不能飲食 當歸 為細末空腹差量最湯服方寸と漸加至二七乃利 遠志鍵 治心氣不足端悸汗出心中煩悶短無悲憂獨 方十 白术 良薑等華黃橘皮祭 桔梗 桂錢叁 吴茱萸

皮湯下婦人 煎至七分食後温服 治人心痛不可忍 煉塞和元如梧桐至 〈方十 人醋湯下 附子 乾薑 盏生薑二 毎服三十 **大**各意

何湯下人服令人 分食後温服 写為細末每服一錢水 **芍藥** 是治治痛 白茯苓 人參 桂屬 為細末白麺以為頭洛壹 沿心經行學 當歸 **委門冬 黄耆** 人心開聰惠 **州凉血療瘡** 甘草 黄芩縣 乾地黄 

若痛而衝聚往來上下行痛者休止腹中熱燥煩吐清水 如智元九痛元方在 其脉當痊而無常此由胃弱而濕則生重謂之重漏宜此 四宜此方 膈注心中邪氣隨經直干於心診其脉緩甚謂之脾心智散若痛如針刺其心而痛甚者此脾受邪氣以其脉 服三十元茶下 右為細末將三味為末研与以附子膏元如菜豆大每附子末醋 養成膏為 客地門 客吃僧 耐 バケナー 九

服 青皮醇 桂 冶脾胃傷 **热服空心食前** 服三錢水一盏盐一字前至七分去浮温 農黄面焙乾 冷心腹疼痛又治霍乱吐渦婦人血氣 一錢水一盏生薑三片煎至六分去 人塩沸湯點亦得 乾薑 茴香

湯化下一元 薑城用 安息香浴室 **宜** 既遊艇此當用雄黄 完如梧桐子大每服十元 木香谷煎附子 阿各 桃心湯珠 菖蒲两肆 総即分

右為鹿末每服二錢水一次 教典黄 茯苓路肆人益 温服 右為應末每服三錢水一盏東一柱碼略重甘草 遠志 茯神 一盏生薑一片煎至六分温服 半夏 一枚同煎至六分去滓 桂谷多 防風

**宜附子細辛湯**好在思熱脉疾小便赤遊宜茯苓湯 心咳脉浮恶風宜桂心湯思寒時不能言口紫脉緊 煎至七分食後温服 煎至八分 通口服不拘時 右為細末每服二錢水一落生薑三片東一枚擘破同甘草學或赤小豆轉料 右為細末每服二錢水一盏用銀耳環一隻恋白一寸 麦門冬醬人麥頭 紫花賣 **芍薬**粒 治心氣虚弱少樂多憂 羗活 甘草浴壹

時 右為應末每服五錢水二盛煎至七分去滓温服不以柴胡船半五味子禮 杏仁壹分 右為應末每服五錢水二盞煎至一盏去滓温服 人參前 茯苓 具母酪半甘草 治心痛 乾薑 麦門冬 桂 遠志分壹 巴豆豉油 黄芩香 麻黄

食前服 右為細末煉蜜為元如梧桐子大母服三十元米飲工乾薑 半夏酪壹白木 随 細辛 胡椒酪生 右為應求每服五錢水二盏煎至一盛去滓温服 通記治九種心痛 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三元食前温酒 紀治心腹痛 高良薑品治心痛 スケー 厚朴願當歸 桂香 胡椒香半

右五味㕮咀皆畢用二石英各一兩石脂等三味各一 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元空心米飲 右等分為細末煉蜜為元如梧桐子大每服五七元至 一元空心木香湯下 白石脂 紫石英 白石英 路 認治心腹俱痛 必主心虚酶悸 **乾薑**拾两 寒熱百病令人肥健 當歸 赤石脂 良薑

右為細末每服三錢水一盡入塩少許同煎至六分去 遍百脉中行若大公者春秋各四十九日服今疾退服 置新藥中同煮至藥尽不妨其水数一准新藥總尽便服日三夜一服後午時乃食日日依前秤取昨日藥仍 添水去滓服之至四十日止忌酒內藥水須用大升取 丁亦用大升服湯荒即便行動勿得住坐及卧今藥力 川島頭鍵 直須澄清藥汁乃佳 一治心腹疼痛不已 オナー 益智 經青橋皮 乾薑錢 苗香錢 前前一宿且勿食程 十三 定則分案四

尼部的治心腹疼痛寒冷停疑服斯加至二十元煮聚汁送下忌醋物石為細末煉蜜和元如梧桐子大每服八元日再夜一 右為應末每服五錢水二盏生薑三片聚三枚煎至一柱枝 白芍藥路學 鳥頭雲雨 甘草願 引肝腎脉弦大而緊人成寒疝宜此 桂枝 小腹此寒氣客於厥陰之 杏仁於氣 茯苓陸分

送回 服之能 寬神消慮全志通神明不老不志 時 变元 治九種心痛 右為細末醋夷麵糊為元如梧桐子大每服十元先用 右為細末每服一銭食前温酒調下 油衮過熱醋下男子冷水下 子大皇就中方補心虚健忘助神 右為鹿末每服三銭水一盏煎至七分去滓温服不以 乾薑 **茴香** 臺字當歸 龜甲 一方十 良薑 龍骨 遠志 金毛狗脊 十四 官桂等分 首庸的宣 燕美格壹

在財可服 定是治心氣不定五臟不足恍惚振悸憂愁傷晓夜多 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食後臨 会無聽魔恐怖不軍喜怒非時朝差喜勵暮差朝劇或發 右為細末以棗和元如梧桐子大空心清净水吞下一元 人參 緩謂之胃心痛宜此 是認治若痛而但腹脹心痛甚者此由胃邪干心其 酸聚仁 光明珠砂 茯神 遠志 雪白茯苓两半 明净乳香浴壹 菖蒲兩半

右三味為應末水五升煎取一半較去滓入好蜜二 **再熬成當温酒化下一彈子大不以時** 右三味為細末水塞麦麵糊為元如梧桐子大每服三 班猫條 立味子 m 桂 治心痛 一治心痛腹痛人症瘦弱 治心痛 、醋湯下男子菖蒲酒下不以時 小以水三升煎至一升去浑分温三服不以時 胡椒群拾 广丘 川鳥頭各壹兩 乳香音象 兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧桐子大每服三四十元 米飲或酒下空心服 右等分細末每服二三銭白湯點不以時温酒亦得 右為細末每服二錢食前前半萬屬皮湯調下 元治心腹疼痛 乾薑 記治人患心痛時發不定多吐清水不下飲食 极丽 幣甲特兩 雄黄膩兩 治若氣心腹堅脹飲食不消 真良量水洗去油 吴茱萸肆兩 好時煮升漫火 訶梨勒皮壹两

石為細末生薑 麵糊為元如桐子大每服二十元至三東皮格益納 巴豆成炒巴豆食黄去巴豆不膈良薑生用 乾薑熬過半夏瀬雨作青皮不去 半夏痘 肥皂角抵馬属勢 肺嗽附 一一部和元如梧桐子大每服七元生喜湯下空心 切痰積心痛不可忍者 **革歷子**解甘草 、ケナ 紫苑 着青皮牌 食前服 出声者

**鶴或笑或歌或怒無常或乾嘔言語過多觸風邪而便** 紫苑 一歌四時往來不愈 杏仁 人参 經平 深塞和元如櫻桃大石菖蒲 木通 中閉塞咳嗽短氣氣從背脊有時而痛然 五味 治肺氣不 杜仲 每服一 陳皮 教冬花 麦門久洛當 白木 具母 獨活 ヺ 一元含化工 百合 不各壹

子桂減半人嗽虚寒人加蜀椒一分 血胃痛引者支飲欲嘔 頭脏咳逆上氣時忽忽欲絕心下弦急了 五草裕寺防風 治酒後勞倦或出當風喜怒氣会於肺面目黄腫 で方土 け稍熱服で 的務實校苓 速志 蜀椒 小以時夏秋此 へ盛入生萬二 附子 十七 務量細辛

委門冬 阿膠 9章鳥地 两 一个 一个四元每服一元經 貝母 下野半 遠志 **錢空心温酒** 人格子仁 が重 、各喜豆

白皮等四味並細到用生量汁煮三二十沸重較定此方內前載之內四般皮藥各量兩桑白皮 白楊皮 地骨皮 槐白皮 **吃為細末與前藥末和勻每服** 方士 **遂**同煎至六分1

委門冬 **作**各在 极解 附子 百部 **心滅食嗜野** 元含化 分各 拾 伦尼

飲或酒下 右為細末煉蜜和元如梧桐子大母服三十元空心米 石為細末鎔蜡元如彈子大每服一粒水一盏煎至 和浮熱服之食後 政治十五 石英元治肺虚咳嗽背寒食少泄鴻 人參 一種嗽上氣不順咱喉痒 白石英粉 堪煎於 麦門冬 黄着 桂丽壹 鹿角膠 世草麻羊 乾薑 五味子

薑湯下 全不皆食及寒毒症嗽咯睡膿血 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前 右剉碎焙乾為末每服 桔梗 貝母酪童甜草產 杏仁點體乾薑 治肺挾寒上氣咳嗽育滿短氣嘔吐痰涎喘鸣 科 雪白茯苓 陳皮 桑白皮 附子 錢津液合化徐徐感之 甘草略堂 紫苑 紫蘇華菜 杏仁 細辛 款冬花 人多畔 **対**冬花 桂两春

在味子 紫苑 大腹皮 棗湯下 石為細末 甘草 橘皮 人參 赤茯苓兩產 八利痰涎嘔逆可思 細菜花 白木各叁

刀冝服補肺 分去滓温服不以時 有為鹿末每服三銭水 去澤不以時是生冷油膩等右為應末每服三銭以水一中盡入棗三个煎至六分 白石英 白茯苓 附子略壹 甘草解 阿膠 治肺氣虚思寒咳嗽鼻有清涕息氣微四肢少 五味子兩意奏明冬分里惠方内亦載之人參用童兩 老痛而不休此重於寒寒留不去與正氣相 二銭水一大盡入生薑少許同煎至 陳皮香壹 乾薑畔

在後 當歸 附子 乾薑 附子 厚朴 大門冬濱爾 宜此温中 治寒嗽 每服五錢水二盏煎至! ジラと 桂香貳 一各伍 如雞頭大每服 蜀椒煎 桔梗 桂達兩 乾薑 个香路半 } 自术 蜈蚣丘節 鳥頭臺所 与藥 盞去滓温服 元含化食後臨

色口中如含霜雪語聲不出 短氣寒從背起有時而痛乾嘔心煩耳聞風雨聲面目白 右為應末每服四錢水二盏入竹二十業東五个同煎 卧 晝夜十元以宵中温為度 認治肺氣不足咳逆上氣心胃氣逆喉中悶塞效嗽 麦門冬雕 五味子懸紫苑 **款冬酪真白石英賣兩** 人參稱壹 知母 桂陸两 乾薑 桑白皮

至八分通口服 石為細末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盛入生 桔梗 二片煎至七分和滓温服食剂 逆恶心事壅清涕咱乾喘滿 分為細末每服二錢水一盏大黃臈一皂大同煎 膠 治肺氣不足寒邪外乗咳嗽多 五味子 山藥 於壹甘草 半夏壹分 具母

温服不以時 右為應末每服二 石為應末每服二錢水一盏東 木香 乾薑 此由腎受邪寒逆氣上 温服食後 **須寒嗽** 款冬花 白木 **芍藥**格量半夏 桂谷參 一錢水一 桂路半 甘草壹分人參半两 一盏生量三片煎至六分去字 枚擘破同煎至七分 附子 我各

石為應末每服五錢水二盏養羊內湯一盏煎至七分 旨為細末水煮麵糊為元如梧桐子大每服四十元生 戎蓝畔 泽温服 茯苓 桂式两 半夏麹格城 百合 ベカナー 良薑 甘草於多 桔梗 吴茱萸 人多 烏塚 芍藥 五味子 **芍藥**務章 世三 黄耆 澤湯為壹 貝母

三不知稍稍加之忌猪內冷水生态生菜等空心生薑右九味為細末煉蜜酒和元如小豆大每服三十元日 湯下 薑湯下食後 脚處浦或時下利肩背疼倦飲食減少 鍾乳 数冬花 細辛 两 紫花 给分 款 冬 花 器元治肺胃俱寒效嗽上氣咀膈落噎嘔吐痰沫 發元 療嫩逆上無解歌冷嗽晝夜甚喉中水雞聲 華撥 人參 乾薑 黄橘皮醉壹 乾薑分抵 良薑 舞车 杏仁肆两 白术藍洲

呷喘悶介介作聲育膈痞滿不欲飲食 去浑食後温服臨即更服 右為鹿末每服三錢水一盛入生薑三片同煎至七分 右為細末煉蜜和元如梧桐子太每服十元米飲下不 以時服 形設治肺感寒邪咳嗽不已痰實涎盛頭昏鼻塞呀 阿廖碑 貝母碑 治氣嗽呼吸短氣心骨不利可思飲食 乾桑素成甘草碑 知母武 半夏 太冬花 船半 細辛 默 冬 两 杏仁香肆

服非時 津器威之非時含一茶匙照津 右都於銀鍋中以慢火前攬勿住手候稀稠得所以下 写為細末每服三錢水一盏東二个煎至六分去滓温 鹿角膠 杏仁兩 是升麻以治虚熱也 白糖路室生薑汁這酥 生姓黄汁湖 治肺臓虚執咳嗽或乾痛睡膿血宜服此方 グカナ 黒錫 白蜜 川麻 木香浴室

石為細末煉蜜和元如麻粒太每服二三元食後臨卧 ·蘇服若有所覺 一滴同煎八分通口食後服此補五臟虚些九九味為細末每服二錢水一盛入銀耳環 桂略壹 當埽 |治冷嗽氣嗽飲嗽 が大士 芫花 班乾薑 尚香两半 一盏 世五 芎 躑躅花

**阜中清涕喘出清痰穀飲不消臟腑不調** 松落氣道不利飲食進退肌內不澤多倦乏力思怕風寒 温米湯下 右為細末以來的和析熟元如梧桐子大每服三五元 米飲下 治肺胃虚寒父冷不除四時往來動作咳嗽中脘 於元崔氏療肺虚而嗽上無喘急不得坐卧身面 餘直至水盡渡出焙乾入 巴上五味用水二到煮盡水如素先軟即去皮核 生童格壹大東帕 半夏胖 白术 白茯苓酪或 陳皮科

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服十五元至二十 **瓦元治風壅咳嗽化痰涎止喘痞利骨膈肺氣** 宜服此藥若小便不利者服後方該在 者夜一漸加至二十三十元煮東汁送下若腫氣盛者 右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元日二服甚 紫花 数冬花 漢防巴 两童 人参伍分 一く方七 腫下氣止嗽立驗方 阿膠 紫苑 桑白皮湖 具母性 北六 杏仁粉草 五味子格陸 蛤梗 見 母

頭目昏涌 弘灵元治久病不入飲食胃膈痰消痰多咳嗽恶心增煩 皂子大垂煎至四分緩緩以匙抄喫用煮藥湯下用生薑五片水一盞煮至七分去薑然後入藥并棗一右為細末旋以冷水和元如梧桐子大每服三十元先 元食後生薑湯下白湯亦得 茯苓的量栗米茶两白麺賣 治肺虚寒属風所傷語聲嘶塞氣息喘浦咳嗽一 崖蜜 藿香菜 白术 畫汁

**脊膈煩悶鼻塞清涕咽喉乾痛** 和微火煎常攬三上三下與一炊久取畫汁等各 治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘急語聲了 升服方寸七細細咽之日二 人参两式 《敷心骨煩悶口舌乾燥上焦难法 五味子既 一盏煎至六分去浑食後温服 陳皮壹分 杏仁共两 世七 一夜 桔梗华两

八去心麦門冬日 錢同煎至 一滓温服 桂藍

至七分去浑食後温服右為細末每服二錢水一盏入生薑三片棗一枚同煎 右研与東和元如小東大母服 多為細末每服二十元食前米飲下煉塞為元如梧桐 乾薑 川椒群嗽 胡粉壹分 膩粉半錢 萬粉壹分 **筝**他 僧 壹 治積年肺氣咳嗽 叫 款冬花 金箔片肆 細辛 一元綿聚含化 皂角两半 乾薑 黄丹宣分

氣受邪客乗於心蓋肝臟血寒客於血血造而變思 土一蓋去滓温服五錢水 黄橘皮 川椒於雪甘草 社 乾薑地黄 防 芍藥順 當婦 乾薑 氣治寒嗽 一方土 川椒為量甘草 两古藥職 當婦遠 五味子 一盆東 乾薑 枚膠飴如彈子上 古著 桂

熟坤總温再 暖熱呷之尤佳 照津食後臨卧一一題一地胡桃內半枚與藥原 喘鳴肩息咽乾噎氣語聲嘶破身躰疼煩時發寒却能治肺胃受寒咳嗽上氣涎痰不利咯唾涎沫腎 皂兒 桑白皮 赤茯苓两堂 治肺感寒邪有痰咳嗽不治不差 枸杞 水蓼 覆盆子西南 方土 茴香 麻黄 杏仁 荆三稜西壹 **淺明三七分食後臨即** 廿九 甘草科

器息有音 石為細末煉蜜和元如彈子大每服一元含化 不為應末每服二錢水一盏煎至六分去洋食後温服 百部 五味子 甘草縣東紫苑 煉蜜和元如梧桐子大每服二元至三元食 虚寒嗽不已 桂門宣 乾薑 乾薑

先研杏仁 薑汁給壹 青别 研炒 五味子願白蜜師 心骨不 款 冬 花 小利喘息短氣 <del>具</del>毋順 麦門冬醋 麻黄 一盏煎至七公 便不利面目浮腫 甘草門 令稠了 大洋温服 杏仁全分

麦門冬谷參 損傷氣喘咳嗽有血 側植菜商壹 日二道藏 州 两各壹

而喘息有音甚則睡血心咳之 論日咳嗽之說古書咳而無嫩後人 先受邪氣以合於肺也又或感寒飲食入胃從肺脉 得之在心外得之 肺出其聲響是不因痰涎而發者謂之咳言其聲音 於往來也經稱五臟六腑皆令人 以其時感寒受邪於病謂秋得之 肺寒則內外合邪因而客之故咳屬於肺然 一下隨聲而發者謂之嫩如水之 ·服五錢水二盏煎至一 在野四季得之 各半 刑 一盏去滓温服食後 人咳原其至理必由 到兼言之 在肺春得之在 歌蕩謂能

背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳之則腰背相引 氣虚寒而為病或五行之氣内相克制而為病病方作時 尋即治之無使傳注不即治之傳注他臟遂致不起然有 商經自受其邪熱則諸經府藏或董兼而為病風則散之 而痛甚則咳災 石諸咳之原其來雖各不同要之其無必至於肺而後發 了非其時感邪而發咳者因其臟氣表而為病或五行之 有風者有熱者風寒從外至熱則從內起風寒則 則咱腫喉閉肝咳之狀咳則两脇下痛甚則不可 · 熟則調之因風者 恶風出風中則咳甚因寒者 以則心肠下滿脾咳之狀咳則右脇下 痛陰陰引

微小弱者宜鍾乳元思熱咽燥脉數甚則咯血宜天門 肺咳惡風脉浮宜小青龍 乾薑 桂各定銭 時研壹伏 以見傷 悪寒脉緊宜杏子 紫苑 两各半 盞去定 桂

者加阿膠半 右系族末 食前 天門々 、附知母 每服五錢水二盏煎至 **熮蜜和元如梧桐子大每服三十元米飲下** 两大便遊而喘者加革一麼半两 附子 **死**唇囊 桑白皮 两各半 萬浦 桑白皮殖 盛去浑温服

·霜雪中脘陰陰冷悪寒脉緊弱宜温中元大便堅從腹 至頭頭發熱宜茯苓元温中元 温服 煎匹熱目赤脉頭眩冝百部元元於並在後部 若肝咳恶風脉浮宜此射五 若胖效思風脉浮緩宜麻黄厚朴湯口中如 **杯黄**格半 遙前至 一湯悪寒脉弦緊宜五 盞去浑温服 半夏路宣

食後服 石為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元米飲下 為應末每服五錢水二 桔梗路半 半夏冬銭 カナ 半夏群 厚朴 之垂涎沫或有悪物肌痩發 武咳嗽氣急胃中煩悸支射倦疾口 黄橘皮西壹 黄橘皮两 一盏煎至一盏去滓温服不以 サニ 杏仁两半

程氣心松有背拘急的 卧 校同前去海温服不以時 黄香等分 盛煎至六分生 薑三片東二 · 孟入生 萬七山 丁减半 前至

温服 石㕮咀用 者錦墨細 オナ 各壹 甘草 世四 近飲食

九食後服生薑湯下 八家 夏 717.1 **細**室 各肆 各壹 ,` 生 两直 计主 **鉛霜** 杏

**善湯下** 五味子隨不 湯調下不以時 如梧桐子大每服二十元食後 具母 **广** 两各 半 素 两

良後温服 細末毎服二 半前两 一方士 **芍藥**岩两 茯苓路壹 一錢水一 一錢水一盏煎至七分去滓温服不以 一盏生萬五片前至七分去字 主まれ 文壹分 百合浴室

右為細末入研藥与以生薑汁麦麺糊為三華產幣 朱砂 五靈脂兩 杏仁 不利呀呷有聲 痛痛則氣迹氣 者此寒氣客於腸胃得二十元食後生薑湯下 治肺壅痰質咳嗽喘急骨膈痞悶心必煩躁 盡去 温服食後 盛生曹五片東一箇錫 五點府務立在井两鼓炒

右為應末每服五錢水二~ 粳米湯及炙中脘 空心食前服 後温服 一為鹿末每服五錢水二盏竹菜一把煎一盏去浑食 中脫完在心歧上骨下至臍上取中心是穴可炙五 地骨皮 百部两人为藥 |遙東||枚煎至||盞去滓温服 粳米縣两 **乔茯苓**两壹

宜此 **煎棗湯下** 石件等分為細末煉蜜和元梧桐子大每服 石為細末毎服二錢不以時自涉點服 款冬花 杏仁頑 加治嗽久不已者 へ参 一治枯瘦發咳逆上氣喉中有病心下煩不想 大方土 百部 紫苑 白木 络叁 五味子燈 款冬花 世七 皂角 本两半

**刚至六分稍熱服** 為細末 為細末每服 沙黄阿膠 オナ 人盐煎 勿痰涎咳嗽 阿膠為半 黄香两壹 サハ 大每服一 小不以時

米飲下 浑温服食後 防風 治壅嗽 治肺虚咳嗽 个每服一 經攻注面生風雅上 桑白皮 杏仁两壹 各蝎煎散更不頂元 一錢白湯調下不以時 仁景哉 一治浸賣日 橋米在台 半夏島两 一喘氣促咳嗽等疾 **强烈至七** 

湯下 一治肺虚 泊氣咳不問遠近 一錢水一 **参**湯下 杏仁 盞煎至六分去沒 **等分** í 臨卧温服

百部聯 オナ 生地黄怒 陸全台 語音不出温肺 会服二

温服不以時 **兀荆芥湯下 無則縮縫絀急** 111111 附子格壹 以皂角膏和元如梧桐子 斗浸揉取濃汁源去津熬成膏 益雄白三寸同煎至五 2 拥 而 即、

右入瓦合内不固濟坐合子地上用土 冷出之 石以故常聚就 盐半斤炒 雄黄富两 名良萬里湯治 石肺勞咳嗽 一寸以炭一 熨法 用蟾酥和如栗米 族定頂火煅之 方在前湯 路血 周匝今審 退火

日氣滿於皮膚中殼然不堅逐與仲景厚 可三服 消得之因取轉數多病已月餘兆按甲乙經云三焦脹 酒治咳嗽 以納袋盛内二到酒中六七日可飲四五合稍增之 小其服允經二十日脹消而已今具方 和元如彈子大每服一元食後含化日

**渔兆日宵痺也因與仲景三物** 服即减之 雷道矩病吐痰坐填間已及升餘效不甚面色黯鬱 有沒善華夫棗湯酒肺 服記已竟曾中快利略無 快兆告日肺中有殘骨膈不利令服仲 鹿皮夫 /母患育中落急了 到 
夏取三升去滓服一升日三服今人 生薑瓣奶 人多壹两 半夏素两 | 劑知二劑愈

與外基第十廣濟紫苑湯爲元令服之乃効 心骨壅悶咳血三兩口即止晚後旅數口乾涎睡稠粘效 國博王珣患咱喉喧塞胃膈不利時發寒熱夜多盗汗忽 有人病人嗽肺虚生寒熱以默冬花焚三兩機俟煙出以 筆管吸其煙滿口則嗾之至倦則已丸數日之間五七作 以 吸 麸冬花煙嚥之 父, 詳病證肺虚其中客熱證皆因誤灸服暖藥所致添 一两聲不透肩背微痛於開元氣海中脫三里等穴着 治咳嗽睡膿血肠下有痛處不能卧 一 廣濟紫苑湯為元

通面目浮腫喉中呀呻嗽逆短氣呼吸氣塞語聲子 入膠飴一匙再温動調勻服日二三食後服右為細末每服三錢水一盛半煎至一選取 N諸墩並可服之 乾豊 蜀椒 皂莢 秦白皮痘 治上氣咳嗽心下堅痛咱中腥臭骨肠支 桂两角 紫花谷 数石 吳茱萸两壹 **東公東地黄** 桂 杏仁 鳥頭谷壹 款冬花 阿膠為壹 一盏取六分清

以時 杏仁酪壹 門冬料两 小煉蜜和元如彈子大食後含化 グラト **新元如梧桐子大每服三元食前** 察咳嗽宜此潤心養肺 自茯苓 乾薑雅 虚寒咳嗽食少 嫩並治 具母 **麸冬花**燈 7.5

酒下忌恋 黄蜡皂兒大一 名樂各等分米泔浸一在暴乾為散每服二錢水 皂角 治人咳嗽不差氣喘欲絕肺傷睡膿皂兒大一塊子通煎至七分温服食後 外蜜和元如梧桐子大每服 三五元空心温 乾薑 百合 黄芩路童 桂分子 桑根白皮 款冬花燈

有為細末囊內和元如梧子大母服二十元米飲下一時度 白茯苓谷寒 桑白皮料 為應末每服四錢水一中盛入竹茹一握煎至六分 桂雞乳 治肺虚咳嗽咯睡脹血 以時温服 白石英粉 五味子 乾薑 四十四 人参 麦門冬

右件三味都揚熟入生薑地黄客相和以馒火熬成看 右合煎為青母服杏核大含化不以時格時各壹两貳味煎令 杏仁路學 生薑汁 个津器中蜜以之每服以温粥飲調下半匙日三服 治人新咳嗽上氣心胃煩熱強膿血方 治上 一無咳嗽喘息喉中有物睡血 一般二錢水一盏煎至七分食後去滓温服 生地黄汁藍 生薑汁禮 蜜 白蜜萱中 杏仁两半 杏仁

一木两 食後臨卧温服 歌嘔吐寒劫 杏仁科 一錢水一 **盛入生薑三片同煎至七分** 細率 7 - . 2 半夏 具母给參

方四味以水三升研杏仁工 以時 温服不以時 盛生畫三片煎至七分 酥痘 四十王 服 匙日三

		雞拳誓濟方第十一			稍加至兩匙忌猪內